

Dontisolon® D Mundheilpaste & Zylinderampullen

Für eine unbesorgte Zeit
nach der Behandlung

Vielseitig einsetzbar in der Mundhöhle



- + Zur vorübergehenden Behandlung bei akuten entzündlichen Erkrankungen
- + Zur vorübergehenden Anwendung an der Mundschleimhaut und in Zahnfleischtaschen*



* **Indikation der Paste:** Zur vorübergehenden Anwendung in der Zahnheilkunde bei akuter Zahnfleischtzündung (Gingivitis) und Mundschleimhautentzündung (Stomatitis) sowie bei Perikoronitis (Dentitio difficilis).
Indikation der Salbe: Zur vorübergehenden unterstützenden Anwendung bei akuten Entzündungen in Zahnfleischtaschen. Bei Perikoronitis (Dentitio difficilis) der Weisheitszähne. Zur zeitweiligen Notversorgung bei Pulpitis bis zur späteren Exstirpation.†

Dontisolon D Mundheilpaste 5 mg/g Paste, Dontisolon D Zylinderampullen 5 mg/g Salbe
Qualitative u. quantitative Zusammensetzung: **Wirkst.:** Prednisolon. **Paste:** 1 g Paste enth. 5,58 mg Prednisolonacetat, entspr. 5 mg Prednisolon. **Salbe:** 1 g Salbe enth. 5 mg Prednisolon. **Sonstige Bestandteile:** **Paste:** Milchsäure, Calciumlactat-Pentahydrat, hochdisp. Siliciumdioxid, Guar (Ph. Eur.), Hyetellose, Carmin (E 120), Glycerol. **Salbe:** Calciumglutamat 4 H₂O, Macrogole (4000, 2000, 400). **Anwendungsgebiete:** **Paste:** Zur vorübergeh. Anw. i. d. Zahnheilkunde b. akut. Zahnfleischtzünd. (Gingivitis) u. Mundschleimhautentzünd. (Stomatitis) sowie b. Perikoronitis (Dentitio difficilis). **Salbe:** Zur vorübergeh. unterstütz. Anwendung b. akut. Entzünd. i. Zahnfleischtaschen. Bei Perikoronitis (Dentitio difficilis) d. Weisheitszähne. Zur zeitweilig. Notversorgung b. Pulpitis b.z. späteren Exstirpation. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichk. geg. d. Wirkstoff, Prednison o. e. d. sonst. Bestand.; Infektionen, außer i. Rahmen d. Indikat.; Infekt. d. einige progress. Herpesviren (einschließl. Hepatitis, Herpes, Varizellen, Herpes zoster), Mykosen u. tuberkul. Prozesse a. d. Mundschleimhaut, Impfreakt.; psychot. Zustände, d. noch nicht medikamentös beherrscht werden; darf nicht i. Wunden eingebracht werden, d. durch Nahtverschluss oder Lappenplastik gedeckt werden. **Zusätzlich Salbe:** Nicht in Fistelkanäle instillieren. **Nebenwirkungen:** Lokale Überempfindlichk.-reakt. sind möglich. **Selten:** sofort o. innerh. d. ersten Std. system. Überempfindlichk.-reakt., i. Extremfall lebensbedrohli. Schock.

Nicht bekannt: erhöht. Infektionsanfälligkeit, Nebennierensuppress. o. Nebenniereninsuff., Nebennierenrindenatrophie, unregelmäß. Menstruat., iatrog. Cushing-Syndr., Manifest. e. latent. Diabetes, vermind. Kohlenhydrattoleranz, Hypokaliämie, Natrium- u. Flüssigkeitsretention, metabol. Alkalose, Schlaflosigkeit, Euphorie, deprim. Zustand b. Absetzen d. Behandlung, Unruhe, Manie-ähnliche Episoden, Delirium o. verwirrte, traumatische Zustände, erhöht. intrakran. Druck mit Papillenödem (Pseudotumor cerebri) üblicherweise nach Absetz. d. Behandl., Krampfanf., Chorioretinopathie, verschwom. Sehen, Katarakt, auch subkapsulär. Katarakt, erhöht. intraok. Druck, Glaukom, kongestiv. Herzversagen, Hypertonie, Akne, Ekchymose, Kontusion, Hautatrophie, Hypertrichose, Hautverfärb., Osteonekrose des Femur- und Humeruskopfes, Muskelatrophie, d. e. Muskelschwäche vorausgeht (erhöht. Proteinkatabolismus), Sehnenriss, Osteoporose, Wirbelkompressionsfrakturen, patholog. Brüche lang. Knochen, verzög. Heilung.
Inhaber der Zulassung: Septodont GmbH, Felix-Wankel-Str. 9, 53859 Niederkassel, Deutschland.
Stand der Information: März 2022. **Verschreibungspflichtig.**

Ansprechpartner:
Septodont GmbH
Felix-Wankel-Str. 9
53859 Niederkassel
Deutschland
Kontakt: info@ultracain.de
Tel.: +49 (0) 228 971 26-0
Fax: +49 (0) 228 971 26-66

Dontisolon® D Mundheilpaste & Zylinderampullen



Wirksamkeit und Verträglichkeit^{1,2}

- + Entzündungshemmend
- + Abschwellend
- + Heilungsfördernd
- + Schmerzlindernd
- + Mindert die Blutungsneigung

Mundheilpaste

Vielseitig einsetzbar¹

Mundheilpaste zur vorübergehenden Anwendung bei akuten entzündlichen Erkrankungen der Mundschleimhaut

- + Gingivitis
- + Stomatitis
- + Perikoronitis (Dentio difficilis)

Dosierung¹

- + 3 × täglich nach den Mahlzeiten je 0,5–4 cm in Abhängigkeit der zu behandelnden Fläche auftragen (Tubenhals nicht anfeuchten, da Paste sonst verhärtet)

Darreichungsformen¹

- + Tube zu 15 g für die Praxis
- + Tube zu 5 g für die Nachbehandlung zu Hause

Haltbarkeit und Lagerung¹

- + Nicht über 30 °C lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- + Nach Anbruch 12 Wochen haltbar

Erstattungsfähig innerhalb der zugelassenen Anwendungsgebiete (Gingivitis, Stomatitis, Dentio difficilis).

Zylinderampullen

Vielseitig einsetzbar²

Zylinderampullen speziell zur lokalen Instillation

- + Zur vorübergehenden, unterstützenden Anwendung bei akuten Zahnfleisch-taschenentzündungen
- + Zur zeitweiligen Notversorgung bei Pulpitis bis zur späteren Exstirpation
- + Bei Perikoronitis der Weisheitszähne

Dosierung²

- + 1 × täglich zu Beginn der Behandlung, mind. im Abstand von 2 Tagen

Darreichungsformen²

- + Packung à 4 Zylinderampullen zu je 1,9 g
- + Zur Instillation separat erhältlich: Packung à 50 sterile Einmalkanülen (stumpf)

Haltbarkeit und Lagerung²

- + Bei 2–8 °C unter Lichtschutz lagern, bei Raumtemperatur anwenden
- + Reste nach Anbruch verwerfen



Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich alle Aussagen auf die Fachinformation Dontisolon® D Mundheilpaste und Zylinderampullen. Stand März 2022.

1. Fachinformation Dontisolon® D Mundheilpaste. Stand März 2022. 2. Fachinformation Dontisolon® D Zylinderampullen. Stand März 2022.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ultracain.de/dontisolon
Kontakt: info@ultracain.de

Dontisolon® D ist über den Dentalhandel zu beziehen. Es gelten die Preise und Konditionen der jeweiligen Händler. Die 5 g-Tube ist auf Rezept über die Apotheke erhältlich.